




FERTILIZANTE INORGÁNICO LÍQUIDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nutriente	% en peso
Nitógeno Total (N)	11.00
Fósforo (P ₂ O ₅)	37.00
Hierro (Fe)	00.05
Manganeso (Mn)	00.05
Zinc (Zn)	00.10
Boro (B)	00.02

 **NUTRIGOTA® ENERGY** tiene una excelente respuesta durante las primeras etapas de crecimiento, en las cuales las plantas obtienen hasta el 65% del total de Fósforo de sus requerimientos para la producción.

PRESENTACION: 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L



REGISTRO: RSCO-218/XII/09

- ✓ Fuente energética para la planta.
- ✓ Polifosfatos 100% asimilables.
- ✓ Estimula el desarrollo radicular.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

APARIENCIA	Líquido
COLOR	Café oscuro
pH (20-25°C)	Entre 6 y 7
DENSIDAD a 25°C	1.40 ± 0.05 g/mL
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (1mL/L a 25°C)	1.4 ± 0.3 mS/cm



Por su alto contenido de Fósforo **NUTRIGOTA® ENERGY** favorece la floración y propicia un vigoroso arranque del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	ETAPA
Alfalfa	20	A los doce días después del corte.
Algodón	5 a 10	Poco antes del papaloteo, seguir aplicando cada 15 o 20 días hasta formación de capullo.
Cafeto	20	Hacer 2 o 3 aplicaciones durante la floración y hasta el llenado del fruto.
Chile, Tomate, Berenjena	10 a 20	De 3 a 5 aplicaciones, según el ciclo de cada cultivo. Para almácigos, aplicar una solución al 0.3% por las tardes cada 3 días en floración y formación de frutos.
Papa	20 a 40	Durante el primer tercio del ciclo, de 2 a 4 aplicaciones.
Lechuga y Espinaca	10 a 15	Primera aplicación 10 días después del trasplante. Segunda aplicación 20 días después del trasplante.
Berries (Grosella, Fresa, Mora, Arándano y Frambuesa)	20 a 40	En floración y cada 15 días durante el periodo de producción.
Frutales (Aguacate, Mango, Limón, Lima, Manzana y Peral)	5 a 10	Hacer 3 o 4 aplicaciones durante la floración y hasta el llenado de fruto.
Melón, Calabaza, Pepino, Sandía	20 a 40	Aplicar en riego 3 a 4 aplicaciones durante la floración y hasta el llenado de fruto en intervalos semanales.
Ajo y Cebolla	5 a 10	Hacer de 1 a 3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo, al inicio de la floración y llenado de fruto.
Papaya	5 a 10	Aplicaciones cada 2 semanas desde crecimiento hasta llenado de fruto.
Piña	20	De 3 a 5 aplicaciones, durante la floración y formación de piña.
Plátano	10 a 20	Aplicaciones cada 2 semanas desde crecimiento hasta llenado.
Brócoli y Coliflor	10 a 15	Hacer dos aplicaciones a los 7 días después del trasplante con intervalos de 15 días

COMPATIBILIDAD

Siempre que se pretenda aplicar el producto en mezcla con otros productos, deberá realizar una prueba previa de compatibilidad, éstas deberán hacerse exclusivamente con productos registrados ante la autoridad competente