



REGISTRO: RSCO-119/IX/11

- ✓ Frutos más consistentes.
- ✓ Maduración uniforme.
- ✓ Resistencia a enfermedades.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nutriente	% en peso
Nitógeno Total (N)	7.00
Calcio (CaO)	13.00
Hierro (Fe)	00.05
Zinc (Zn)	00.10
Manganeso (Mn)	00.05
Boro (B)	00.02

Por su contenido de Calcio **NUTRIGOTA® CALCI** participa en la formación de paredes celulares, así como en el proceso de respiración y activación de los puntos de crecimiento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

APARIENCIA	Líquido
COLOR	Transparente
pH (20-25°C)	Entre 5 y 6
DENSIDAD a 25°C	1.33 ± 0.05 g/mL
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (1mL/L a 25°C)	1.1 ± 0.3 mS/cm



NUTRIGOTA® CALCI está recomendado para todos los cultivos que se encuentran establecidos en suelos con bajos niveles de Calcio.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	ETAPA
Chile, Jitomate, Tomate, Berenjena	10 a 15	Al inicio del desarrollo del fruto. Aplicar una vez por semana.
Brócoli y Col	10 a 15	Realizar 3 aplicaciones con intervalos de 7-10 días, iniciando a los 15 días después del trasplante.
Berries (Grosella, Fresa, Mora, Arándano y Frambuesa)	10 a 15	Aplicar una vez a la semana a partir de formación de fruto hasta fin de cosecha
Frijol, Soya, Chicharo, Garbanzo, Cacahuete	5 a 10	Realice la primera aplicación a los 30 días de sembrado y aplique otras 3 con intervalos de 15 días.
Manzana, Durazno, Nogal, Naranja, Limón, Plátano	200 – 400 cc / 100 L de agua	Hacer aplicaciones después del corte, pasando la floración; y cuando los frutos estén en desarrollo y hacer una aplicación pasando la época de cosecha.
Maíz	10 a 15	Realizar 2 aplicaciones a partir de formación de grano y una segunda aplicación a los 15 días.
Cebolla y Ajo	10 a 15	Aplicar una vez a la semana a partir del llenado de bulbo y cabeza hasta cosecha
Lechuga	10 a 15	Una aplicación semanal a partir de formación de cabeza hasta una semana antes de cosecha
Melón, Sandía y Pepino.	10 a 15	1 aplicación a la semana a partir de la formación de fruto hasta fin de cosecha.
Papa	10 a 15	una aplicación a la semana a partir de la formación de tubérculos hasta una semana antes de la cosecha
Rosas, Claveles, Crisantemos, Tulipanes, Petunias	200 – 400 cc / 100 L de agua	Aplicar en la 1ra etapa de desarrollo hasta los brotes florales.
Aguacate	200 – 400 cc / 100 L de agua	Aplicar durante la formación del fruto y repetir de 2 a 3 veces.

PRESENTACION: 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L



COMPATIBILIDAD

Siempre que se pretenda aplicar el producto en mezcla con otros productos, deberá realizar una prueba previa de compatibilidad, éstas deberán hacerse exclusivamente con productos registrados ante la autoridad competente.