

NUTRIGOTA-S®

20 - 20 - 20

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nutriente	% en peso
Nitrógeno Total (N)	20.00
Fósforo (P ₂ O ₅)	20.00
Potasio (K ₂ O)	20.00
Azufre (S)	0.045
Calcio (Ca)	0.003
Hierro (Fe)	0.038
Zinc (Zn)	0.015
Manganeso (Mn)	0.015

 **NUTRIGOTA-S® 20-20-20** es un fertilizante ampliamente recomendado para utilizarlo en programas de fertirrigación, aumenta potencialmente la producción y calidad.

PRESENTACIÓN: 2Kg y 20Kg



REGISTRO: RSCO-164/VII/09

- ✓ Mejora cantidad y calidad de cosechas.
- ✓ Previene y corrige deficiencias.
- ✓ Fuente balanceada de NPK para el mantenimiento nutricional del cultivo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

APARIENCIA	Polvo
COLOR	Blanco
SOLUBILIDAD (25°C)	400 g/L
pH (1g / L a 25°C)	6.9 ± 0.3
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (1g / L a 25°C)	1.2 ± 0.3 mS/cm
Densidad aparente (g/cm ³)	0.7 ± 0.1 g/cm ³



Se recomienda **NUTRIGOTA-S® 20-20-20** desde las primera etapas de crecimiento, cuando se requiere de una alta demanda de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Previene los posibles daños causados por las deficiencias de los macronutrientes que se manifiestan con clorosis y retraso en el crecimiento.

TABLA DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	DOSIS Kg / ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alfalfa	10 - 15	Los doce días después del corte.
Algodón	10 - 15	Desde poco antes del papaloteo, seguir asperjando cada 15 o 20 días.
Cafeto	10 - 15	Hacer 2 o 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y prefloración.
Chile, Tomate y Berengena	10 - 15	De 3 a 5 aplicaciones, según el ciclo de cada cultivo. Para almáchigos, asperjar una solución al 0.3% por las tardes cada 3 días.
Papa	10 - 15	Durante el primer tercio del ciclo, con 2 a 4 aplicaciones.
Frijol, Garbanzo, Chicharo y Soya	10 - 15	De 1 a 2 aplicaciones durante la prefloración.
Fresa	10 - 15	Cuando haya suficiente follaje, después del trasplante, en floración y cada 15 días durante el periodo de producción.
Frutales	10 - 15	Hacer 3 o 4 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y prefloración.
Maíz y Sorgo	10 - 15	3 aplicaciones: En desarrollo, en prefloración y al inicio del llenado.
Melón, Calabaza, Pepino y Sandía	10 - 15	Iniciar a los 30 días después del trasplante, siguiendo con intervalos de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Hortalizas	10 - 15	Hacer de 1 a 3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo, al inicio de la floración y fructificación.
Papaya	10 - 15	Aplicaciones cada 2 meses.
Piña	10 - 15	De 3 a 5 aplicaciones, durante la pre-inducción floral.
Plátano	10 - 15	Aplicaciones cada 2 meses.
Trigo, Avena, Cebada y Arroz	10 - 15	De 1 a 2 aplicaciones, durante el desarrollo vegetativo.
Agave	10 - 15	Durante el desarrollo vegetativo.

COMPATIBILIDAD:

Siempre que se pretenda aplicar el producto en mezcla con otros productos, deberá realizar una prueba previa de compatibilidad, éstas deberán hacerse exclusivamente con productos registrados ante la autoridad competente.



SÓLIDOS